

Hiv in aids v Sloveniji – še vedno v porastu

Slovenija, 2016 (do vključno 22. novembra)



56


novih diagnoz okužbe s hivom, več kot kadarkoli do zdaj v enem letu – največ (46) med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi

Poleg teh so na NIJZ prijavili tudi

4

primere okužbe s hiv pri tujih državljanih z bivališčem v Sloveniji; v tujini so jih diagnosticirali že pred letom 2016, od letos se zdravijo v Sloveniji.

DIAGNOSTICIRANI PRIMERI OKUŽBE



- moški, ki imajo spolne odnose z moškimi
- drugi/nerazvrščeni
- heteroseksualno pridobljene okužbe
- otroci mater, okuženih s hivom
- uživalci nedovoljenih drog (injiciranje)

GLAVNI PROBLEM



Okužba s hivom (po sedanjih ocenah) ni prepoznana pri približno 30 odstotkih oseb, ki so okuženi, kar pomeni, da je tveganja zaradi možnosti prenosa veliko.

REŠITEV



Testiranje in takojšnje zdravljenje. Testiranje je anonimno in brezplačno. Zdravljenje, ki je zdaj zelo uspešno, za 90 odstotkov zmanjša tveganje za prenos virusa na spolnega partnerja. Slovenija je po uspešnosti zdravljenja potem, ko je diagnoza postavljena, primerljiva z najboljšimi v Evropi.


SPLOŠNI RECEPT



Ključna je še vedno dosledna zaščita – uporaba kondoma/lubrikanta, ki danes, ko aids ni več usodna, ampak »le« kronična bolezen, vse pre pogosto ostane pozabljena.

DELEŽ POZNIH DIAGNOZ OKUŽBE

med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi



V Sloveniji so v opaznem porastu tudi druge spolno prenosljive okužbe:

- ▶ sifilis
- ▶ gonoreja
- ▶ hepatitis B
- ▶ hepatitis C ...